

تأثیر الگوی کاشت و مصرف علف‌کش بر عملکرد دانه و کترول علف‌های هرز ذرت دانه‌ای (*Zea mays L.*)

ندا صفردری متفرد^{۱*} - ایرج الله دادی^۲ - محمدعلی باستانی^۳ - حمید ایران نژاد^۴ - اسکندر زند^۵

تاریخ دریافت: ۱۳۸۹/۱۰/۱۵

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۲/۱۳

چکیده

این آزمایش در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقات بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه گیاه‌پزشکی کشور، واقع در ورامین به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوك‌های کامل تصادفی با چهار تکرار به اجرا درآمد. الگوی کاشت ذرت با چهار سطح تکریدیه با تراکم معمول و دو ردیفه زیگزاگ با تراکم‌های معمول، ۲۵ درصد و ۵۰ درصد بیشتر از تراکم معمول به عنوان فاکتور اصلی و مصرف علف‌کش نیز با پنج سطح مخلوط آترازین به میزان ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار و ارادیکان به میزان ۲/۴ کیلوگرم ماده موثره در هکتار و ارادیکان به میزان ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره در هکتار، مخلوط آترازین به میزان ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار و آلاکلر به میزان ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره در هکتار و ارادیکان به میزان ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پیش‌کاشت و به عنوان فاکتور فرعی اعمال گردید. کرتهای شاهد شامل شاهد بدون علف‌هز (وجین کامل) و شاهد با علف‌هز (بدون مصرف علف‌کش) بود. تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه با تراکم معمول به دو ردیفه زیگزاگ با تراکم‌های ۲۵ درصد و ۵۰ درصد بیشتر از تراکم معمول موجب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه ذرت شد. تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه به دو ردیفه زیگزاگ همچنین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز را کاهش داد و الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول، کمترین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز را نشان داد. در الگوهای کاشت مختلف، پس از تیمار شاهد بدون علف‌هز، تیمارهای ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار آترازین + ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره در هکتار ارادیکان و ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار آترازین + ۴/۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار ارادیکان به ترتیب کمترین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز را نشان دادند. از طرف دیگر به غیر از تیمار شاهد با علف‌هز نداشت. در نتیجه می‌توان از مقادیر کاهش یافته علف‌کش‌ها استفاده نمود و در نتیجه میزان عملکرد دانه تیمار شاهد بدون علف‌هز نداشت. در نتیجه دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول (۹۲۵۰ یوتونه در هکتار) و ترکیب علف‌کشی آترازین به میزان ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار + ارادیکان به میزان ۴/۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار به عنوان بهترین تیمار پیشنهاد می‌گردد.

واژه‌های کلیدی : الگوی کاشت دو ردیفه، علف‌کش‌های ترکیبی، تداخل علف‌های هرز، قدرت رقابتی

مواد شیمیایی بر سلامت انسان‌ها، محققان به این نتیجه رسیده‌اند که تولید محصولات کشاورزی با این مواد، به دلیل آلودگی‌های زیست محیطی و اثرات مخرب اکولوژیکی از پایداری لازم برخوردار نیست، بنابراین بایستی به فکر مدیریت پایدارتر علف‌های هرز بود (۳ و ۵). موقوفیت در مدیریت پایدار علف‌های هرز مستلزم پرهیز از کاربرد روش‌های یک جانبه کترول این گیاهان و محدود کردن زادآوری علف‌های هرز، کاهش جوانه‌زنی علف‌های هرز و نیز کاهش قابلیت رقابت علف‌های هرز با گیاهان می‌باشد. تحقیقات نشان داده است که افزایش توانایی رقابت گیاهان زراعی با علف‌های هرز موجب موقوفیت بیشتر در مدیریت پایدار علف‌های هرز می‌شود (۱۸). هم اکنون کترول

مقدمه

امروزه پس از چند دهه مصرف علف‌کش‌ها، به دلیل بروز مشکلات متعددی نظیر افزایش هزینه‌ها، آسیب رسیدن به گیاهان زراعی، آلودگی محیط، ایجاد مقاومت در علف‌های هرز و تأثیر این

۱- به ترتیب کارشناس ارشد و دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران پردیس ابوریحان، تهران
۲- نویسنده مسئول: (Email: neda_sm@yahoo.com)
۳- دانشیاران بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- تهران
۴- به ترتیب کارشناس ارشد و دانشیاران گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران پردیس ابوریحان، تهران
۵- دانشیاران بخش تحقیقات علف‌های هرز، موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور- تهران

مؤسسه تحقیقات آب و خاک، نیمی از کود نیتروژن (بر اساس ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار) و تمامی کودهای فسفات آمونیوم و سولفات پتاسیم، به ترتیب بر اساس ۳۰۰ و ۱۳۰ کیلوگرم در هکتار همراه با دیسک قبل از کاشت به خاک اضافه شد. مابقی کود نیتروژن در مراحل هفت - هشت برگی ذرت به صورت سرک مصرف شد. سپس جوی و پسته‌هایی با فاصله ۷۵ سانتی‌متر در زمین توسط فاروئر تهییه گردید. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی در چهار تکرار به اجرا در آمد. هر واحد آزمایشی با عرض سه متر و طول هشت متر مشتمل بر چهار ردیف کاشت ذرت با فاصله ۷۵ سانتی‌متر بود و بین هر دو کرت، یک ردیف حاشیه منظور گردید. بین هر تکرار آزمایش نیز فاصله دو متر به منظور تسهیل در نمونه‌گیری و تردد در نظر گرفته شد. الگوی کاشت ذرت سینگل کراس (S.C.704) در چهار سطح تک ردیفه با تراکم معمول (۷۴۰۰۰ بوته در هکتار)، دو ردیفه زیگزاگ با تراکم معمول (۷۴۰۰۰ بوته در هکتار)، دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول (۹۲۵۰۰ بوته در هکتار) و دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۵۰ درصد بیشتر از تراکم معمول (۱۱۰۰۰ بوته در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و در ۱۰ خرداد ماه سال زراعی ۱۳۸۶ اعمال گردید. فاصله بین ردیف و بین بوته در الگوی کاشت تک ردیفه با تراکم معمول به ترتیب ۷۵ و ۱۸ سانتی‌متر بود. فاصله بین ردیف در الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ ۲۰ سانتی‌متر و فاصله بین بوته در تراکم‌های معمول، ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول و ۵۰ درصد بیشتر از تراکم معمول این الگوی کاشت به ترتیب ۲۴، ۳۶ و ۲۸ سانتی‌متر بود. عامل دوم مصرف علف‌کش در پنج سطح مخلوط آتزازین به میزان ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار + ارادیکان به میزان ۳/۲۸ کیلوگرم ماده موثره در هکتار، مخلوط آتزازین به میزان ۰/۰ کیلوگرم در هکتار + ارادیکان به میزان ۴/۱۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار، مخلوط آتزازین به میزان ۸/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار + ارادیکان به میزان ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره در هکتار، مخلوط آتزازین به میزان ۰/۰ کیلوگرم ماده موثره در هکتار + ارادیکان به میزان ۲/۴ کیلوگرم ماده موثره در هکتار و ارادیکان به میزان ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره در هکتار به صورت پیش کاشت و به عنوان فاکتور فرعی اعمال گردید. سمپاچی به وسیله دستگاه سمپاچ پشتی مجهز به دسته و نازل خطپاش با مصرف آب ۳۱۵ لیتر در هکتار انجام شد. نازل مورد استفاده در این آزمایش نیز، نازل شرهای زرد با فشار ۲/۵ بار بود. کرت‌های کنترل نیز شامل شاهد بدون علف هرز (وجین کامل) و شاهد با علف هرز (بدون مصرف علف‌کش) بود. به منظور بررسی عملکرد ذرت، پس از حذف یک ردیف از هر طرف ۰/۵ متر از هر یک از دو انتهای هر کرت آزمایشی به عنوان اثرات حاشیه، تعداد بوته‌های معادل سطح ۱ مترمربع از دو ردیف میانی هر کرت برداشت شد به منظور تعیین عملکرد دانه هر تیمار ابتدا تعداد بلال‌ها شمارش شد، سپس دانه‌ها از روی بلال به دقت جدا گردیدند و پس از ساعت قرار دادن در آون ۷۵ درجه سانتی‌گراد، دانه‌ها توزین و عملکرد

علف‌های هرز در ذرت در درجه اول به استفاده از علف‌کش‌ها وابسته است (۱۹). وجود بسیاری از علف‌کش‌های مورد استفاده در ذرت در آب‌های زیر زمینی و سطحی به اثبات رسیده و میزان این مواد شیمیایی در این منابع طبیعی از حد مجاز نیز فراتر رفته است (۱۸). یکی از راه‌های کاهش میزان مصرف علف‌کش در ذرت، افزایش توان رقابتی گیاه زراعی در مقابل علف‌های هرز می‌باشد. مدیریت‌های زراعی، نظیر تنوع در انجام تناوب‌های زراعی، قابلیت رقابت ارقام گیاهان زراعی، افزایش تراکم، استفاده از ردیف‌های کشت باریکتر، کاربرد کود به صورت نواری، استفاده از کود سبز و نیز گیاهان پوششی می‌تواند به افزایش قابلیت غلبه گیاهان زراعی بر علف‌های هرز بینانجامد (۱۶). استفاده بهتر از تراکم و ایجاد فاصله مناسب بین ردیف‌های کاشت یکی از راه‌های مناسب به منظور افزایش قابلیت رقابت گیاهان زراعی با علف‌های هرز است (۲۲). با بهبود آرایش فضایی ذرت، جذب نور توسط کانوپی گیاه زراعی افزایش و در نتیجه تداخل علف‌های هرز کاهش می‌یابد (۱۲). یکی از راه‌های کاشت ذرت در ردیف‌های باریکتر کاشت دو طرفه ذرت می‌باشد به طوری که روی هر پشته با فاصله نرمال (۷۵ - ۷۰ سانتی‌متر) دو ردیف ذرت با فاصله ۲۵ - ۲۰ سانتی‌متر کشت گردد. در این حالت علاوه بر اینکه فاصله ردیف‌های کاهش می‌یابد، آرایش توزیع بوته‌ها نیز به حالت مربع نزدیک‌تر می‌شود. تحقیقاتی نیز در رابطه با تاثیر آرایش کاشت دو ردیفه ذرت بر روی عملکرد ذرت انجام شده است که نتایج آنها حاکی از افزایش عملکرد ذرت در اثر کاشت دو ردیفه می‌باشد (۹، ۱۲ و ۲۴). تراکم نیز از جمله عواملی است که با تحت تاثیر قرار دادن ساختار کانوپی از طریق تغییر شکل اجزای اندام‌های هوایی همچون اندازه برگ‌ها، جهت‌گیری برگ‌ها و نحوه اتصال آنها به ساقه و پیروی برگ‌های پایین‌تر کانوپی قادر به کاهش توان تداخل علف‌های هرز خواهد شد (۱۷ و ۲۶).

به منظور مدیریت تلفیقی علف‌های هرز، در این تحقیق تلاش شد مناسب‌ترین الگوی کاشت و ترکیب حاصل از اختلاط علف‌کش‌های توصیه شده در ایران تعیین گردد، تا از طریق احتمال مقاوم شدن علف‌های هرز به علف‌کش‌ها و همچنین مصرف علف‌کش‌ها کاهش یابد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۶ در مزرعه تحقیقاتی بخش تحقیقات علف‌های هرز موسسه گیاه‌پژوهشی کشور واقع در شهرستان ورامین با موقعیت عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۱۹ دقیقه و ۳۱ ثانیه شمالی و طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۸ دقیقه و ۴۴ ثانیه شرقی و ارتفاع ۷۹۰ متر از سطح دریا به اجرا درآمد. اقلیم منطقه بر اساس طبقه‌بندی دومارتن خشک است. همچنین بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خاک، بافت خاک محل انجام آزمایش از نوع لوئی بود. برای تأمین نیاز عنصر غذایی، و بر اساس آزمایش خاک و توصیه‌های

بررسی‌های مختلف نیز تأثیر معنی‌دار الگوی کاشت کاشت (۱ و ۲۳) و مصرف علفکش (۲) بر عملکرد دانه ذرت گزارش شده است. تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه با تراکم معمول به دو ردیفه زیگزاگ با تراکم‌های بیشتر از تراکم معمول موجب افزایش معنی‌دار عملکرد دانه ذرت شد (جدول ۲). بررسی‌های مختلف نیز نشان داده‌اند تغییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه به دو ردیفه موجب افزایش عملکرد دانه ذرت می‌شود (۱۰ و ۱۲). با وجود عدم اختلاف معنی‌دار عملکرد دانه الگوهای کاشت دو ردیفه زیگزاگ مورد بررسی، الگوهای کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم‌های ۲۵ درصد و ۵۰ درصد بیشتر از تراکم معمول، بیشترین عملکرد دانه ذرت را تولید نمودند (جدول ۲). در این الگوهای کاشت، در نتیجه بسته شدن سریع‌تر کانویی و کاهش منابع محیطی قابل دسترس برای علف‌های هرز، عملکرد دانه ذرت افزایش یافت. بسیاری از محققان نیز افزایش جذب نور، منابع زیر زمینی و همچنین کاهش رشد علف‌های هرز را در تراکم‌های بالاتر گیاهان زراعی گزارش کرده‌اند (۱۴). علف‌های هرز به طور معنی‌داری موجب کاهش عملکرد دانه ذرت شدند (جدول ۲). در الگوهای مختلف کاشت، تیمار شاهد با علف هرز به دلیل تداخل علف‌های هرز در نتیجه کاهش منابع محیطی در دسترس ذرت کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد (جدول ۲). در سایر بررسی‌ها نیز افت عملکرد دانه گیاه زراعی در رقبت با علف‌های هرز گزارش شده است (۷ و ۲۷). از سوی دیگر، به غیر از تیمار شاهد با علف هرز عملکرد دانه سایر تیمارهای علف‌کشی تقاضوت معنی‌داری با عملکرد دانه تیمار شاهد بدون علف هرز نداشت (جدول ۲). بدین معنا که تیمارهای علف‌کشی مورد استفاده با کنترل مطلوب علف‌های هرز و ممانعت از کاهش معنی‌دار شاخص‌های فیزیولوژیک ذرت در تداخل با علف‌های هرز موجب حفظ پتانسیل تولید شدند. با توجه به نتایج عملکرد دانه، به دلیل عدم تقاضوت معنی‌دار عملکرد دانه تیمارهای مختلف علف‌کشی، می‌توان از مقداری کاهش یافته علف‌کش‌ها استفاده نمود و در نتیجه میزان مصرف علفکش‌ها را کاهش داد.

تأثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر علف‌های هرز

علف‌های هرز باریک برگ در منطقه مورد آزمایش شامل قیاق (*Echinochloa crus-galli*), سوروف (*Sorghum halepense*)، اوپارسلام (*Cyperus esculentus*), مرغ (*Cynodon dactylon*) و علف‌های هرز پهن برگ عمده موجود در این آزمایش شامل تاج (*Portulaca retroflexus*), خرفه (*Amaranthus retroflexus*), خروس ریشه‌قرمز (*Glycyrrhiza glabra*) و علف هفت‌بند (*Polygonum aviculare*) بود.

نهایی دانه به دست آمد. به منظور تعیین تعداد و وزن خشک علف‌های هرز در هر تیمار، نمونه‌برداری از سطح معادل (۰/۷۵ × ۰/۳) انجام شد. پس از انتقال نمونه‌ها به آزمایشگاه تعداد علف‌های هرز به تفکیک گونه شمارش گردید، سپس علف‌های هرز شمارش شده به تفکیک گونه درون پاکت قرار داده شد و به آون با درجه حرارت ۷۵ درجه سانتی‌گراد به مدت ۴۸ ساعت منتقل گردید.

نموده دهی چشمی جهت تعیین کارایی عینی علفکش‌ها بر روی علف‌های هرز طبق روش ارزیابی انجمن تحقیقات علف‌های هرز اروپا (EWRC^۱) در ۳۵ روز پس از کاربرد علفکش‌ها، (جدول ۱) انجام شد (۲۱). نمره دهی تیمارهایی که در آنها علفکش استفاده شد در مقایسه با شاهد با علف هرز و بدون مصرف علفکش انجام شد.

جدول ۱- نمره‌دهی بر اساس شاخص EWRC

نموده ارزیابی	درصد مهار علف هرز	توضیح
نایابی کامل علف هرز	۱۰۰	
مهار بسیار خوب	۹۹-۹۶/۵	۱
مهار خوب	۹۶/۵-۹۳	۲
مهار مطلوب	۹۳-۸۷/۵	۳
مهار کمی مطلوب	۸۷/۵-۸۰/۰	۴
مهار نامطلوب	۸۰/۰-۷۰/۰	۵
مهار ضعیف	۷۰/۰-۵۰/۰	۶
مهار بسیار ضعیف	۵۰/۰-۱/۰	۷
کاملاً بدون تاثیر	.	۸
	.	۹

به منظور تجزیه داده‌های حاصل از آزمایش در ابتدا از طریق آزمون تجزیه باقیمانده^۲، داده‌های پرت احتمالی موجود، شناسایی و حذف شدند. سپس با استفاده از آزمون نرمالیتی^۳ از نرمال بودن خطاهای آزمایشی اطمینان حاصل شد، به طوری که هیچ گونه نیازی به تبدیل داده نبود. در نهایت عمل تجزیه واریانس داده‌های حاصله (داده‌های حاصل از برداشت نهایی) با استفاده از نرم افزار آماری SAS (۷.۹) صورت پذیرفت و میانگین‌های به دست آمده با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن در سطح استعمال پنج درصد و با استفاده از همین نرم افزار مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج و بحث

عملکرد دانه

نتایج تجزیه واریانس داده‌های عملکرد نشان داد که الگوی کاشت و مصرف علفکش تأثیر معنی‌داری بر عملکرد دانه ذرت داشتند ولی اثر متقابل این دو بر عملکرد دانه ذرت بی‌تأثیر بود. در

1- European Weed Research Council

2- Residual Test

3- Normality Test

جدول ۲ - عملکرد دانه ذرت در الگوهای مختلف کاشت و تیمارهای مختلف علفکش‌های کاربردی (کیلوگرم در هکتار)

عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	الگوی کاشت
۶۴۵۱/۵b	نک ردیفه با تراکم معمول
۷۳۳۳/۴ab	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم معمول
۸۳۸۰/۸a	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵٪ بیشتر از تراکم معمول
۸۲۲۰/۲a	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۵۰٪ بیشتر از تراکم معمول
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)	علفکش
۸۰۹۴/۸a	شاهد بدون علف هرز
۵۲۳۸/۷b	شاهد با علف هرز
۷۹۸۷/۸a	۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۳/۲۸ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار
۸۰۸۳/۶a	۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۴/۱۰ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار
۷۹۹۸/۳a	۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار
۷۷۰۶/۳a	۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۲/۴ کیلوگرم ماده موثره الکل در هکتار
۸۰۶۵/۹a	۰/۰ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار

اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی‌دار در تیمار ۵ درصد نمی‌باشند.

و آرایش کاشت مربعی و دو ردیفه را عاملی مؤثر در افزایش قدرت رقابتی گیاهان زراعی (به دلیل بسته شدن سریع‌تر کانونی ذرت و سایه اندازی بیشتر) اعلام کرد.

هیدرلی (۱۵) نیز گزارش کرد استفاده از ردیفه‌های کشت باریک‌تر می‌تواند باعث موقیت در کاربرد مقادیر کاهاش یافته علفکش‌ها گردد. رقابت با علف‌های هرز همانطور که در بررسی‌های مختلف (۱، ۷ و ۲۷) نیز گزارش شده است، موجب کاهاش عملکرد دانه شد و تیمار شاهد با علف هرز (بدون علفکش) به دلیل تراکم و بیomas بالای علف‌های هرز، کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص داد (جدول ۲). عدم اختلاف معنی‌دار عملکرد دانه ذرت (جدول ۲) در تیمارهای مختلف علفکش (به غیر از تیمار شاهد با علف هرز)، حاکی از کارایی مطلوب و مشابه تیمارهای مختلف علفکش در کنترل علف‌های هرز است. در نتیجه می‌توان از تیمارهای کاهاش یافته علفکش برای کنترل علف‌های هرز استفاده نمود.

نمودهایی بر اساس شاخص EWRC

الگوی کاشت، مصرف علفکش و اثر متقابل این دو تاثیر معنی‌داری بر واکنش علف‌های هرز باریک برگ و پهن داشتند. نمره‌دهی بر اساس شاخص EWRC به منظور بررسی میزان تاثیر الگوی کاشت و مصرف علفکش بر علف‌های هرز نشان داد، که در ۳۵ روز پس از سمپاشی، در الگوهای مختلف کاشت تیمارهای ۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار + ۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۴/۱۰ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار

الگوی کاشت، مصرف علفکش و اثر متقابل این دو تاثیر معنی‌داری بر تراکم و وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ داشتند. نتایج آزمایش (جدول‌های ۳، ۴ و ۵) نشان داد، ۰/۰ روز پس از سمپاشی، در الگوهای مختلف کاشت تیمارهای ۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار و ۰/۰ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار + ۴/۱۰ کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هکتار به ترتیب موجب بیشترین کاهاش در تراکم و وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ شدند. از سوی دیگر تغییر الگوی کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه زیگزاگ موجب کاهاش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ شد و الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول کمترین تراکم و وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ را به خود اختصاص داد. وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ در الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۵۰ درصد بیشتر از تراکم معمول، به علت تشديدة رقابت درون گونه‌ای ذرت و در نتیجه کاهاش قدرت رقابتی آن با علف‌های هرز، نسبت به الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول، بیشتر بود. افزایش تراکم و کاهاش فاصله بین ردیفه‌های کاشت ذرت موجب افزایش سطح برگ ذرت و کاهاش غلظت جریان فوتون فوستزی قابل دسترس برای علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ موجود در زیر کانونی شد و همین امر کاهاش تراکم و وزن خشک علف‌های هرز باریک برگ و پهن برگ را به دنبال داشت. بگنا و همکاران (۴) نیز اعلام کردند که کاهاش عبور نور از کانونی گیاهان زراعی که در رده‌های باریک‌تر کاشت شده‌اند و یا دارای تراکم بالایی هستند می‌تواند رشد و نمو علف‌های هرز را تحت تاثیر قرار دهد. اسکندری (۸) فاصله کاشت باریک‌تر

نشان داد که تعییر الگوی کاشت ذرت از تک ردیفه به دو ردیفه زیگزاگ با کاهش تداخل علفهای هرز موجب افزایش کارایی علفکش‌ها شد و الگوی کاشت دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ۲۵ درصد بیشتر از تراکم معمول، کمترین تراکم و وزن خشک علفهای هرز را به خود اختصاص داد (جدول‌های ۳، ۴ و ۵). گریچارد و همکاران (۱۳) نیز آرایش کاشت دو ردیفه را در افزایش کارایی مصرف علفکش‌ها مؤثر اعلام کردند.

جدول ۳- مقایسه میانگین تیمارهای مختلف علفکش‌های کاربردی در الگوهای مختلف کاشت بر تراکم علفهای هرز باریک برگ (تعداد در مترا مربع) ۳۵ و ۵۰ روز پس از سمپاشی.

*-اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی‌دار در تیمار ۵ درصد نمی‌باشند.

جدول ۴- مقایسه میانگین تیمارهای مختلف علف کش های کاربردی در الگوهای مختلف کاشت بر وزن خشک علفهای هرز باریک برگ (گرم در مترمربع) ۳۵ و ۵۰ روز پس از سمپاشی.

۵۰ روز پس از سمپاشی ۳۵ روز پس از سمپاشی

علفکش	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم معمول							
شاهد بدون علف هرز	./.....e*	./....f	./....e	./....e	./....e	./....e	./....f	./....f
شاهد با علف هرز								
۰/۰ کیلوگرم ماده موثره								
آترازین در هектار +۰/۲۸	۳۷/۵۱۶a	۲۵/۴۶۶۳a	۱۹/۹۵۲۷a	۲۲/۷۵۱۰a	۶۵/۳۱۳a	۶۰/۹۴۷۵a	۴۱/۰۲۵۰a	۵۰/۵۴۸۸a
کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هектار								
۰/۰ کیلوگرم ماده موثره								
آترازین در هектار +۰/۱۰	۳۲/۱۶۳b	۲۳/۴۰۴۱b	۱۶/۲۷۷۵b	۲۱/۵۷۶۷a	۳۱/۲۳۵b	۳۱/۰۲۵-b	۲۲/۷۰۵-b	۳۰/۸۰۰-b
کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هектار								
۰/۰ کیلوگرم ماده موثره								
آترازین در هектار +۰/۹۲	۱۶/۹۳-d	۹/۳۵۱۷e	۷/۳۳۱۳c	۹/۱۵۱۷c	۱۹/۰۲۵-c	۱۶/۸۰۳۸d	۱۴/۴۹۲۵d	۱۶/۸۰۰-d
کیلوگرم ماده موثره ارادیکان در هектار								
۰/۰ کیلوگرم ماده موثره								
آترازین در هектار +۰/۴	۳۱/۰۱۴b	۲۰/۸۵۷۹c	۷/۷۵۰-c	۱۸/۷۶۵-b	۲۹/۵۵۰-b	۲۲/۳۸۰-c	۱۹/۲۶۵-c	۲۱/۵۵۸c
کیلوگرم ماده موثره آلاکلر در هектار								
۰/۰ کیلوگرم ماده موثره								
ارادیکان در هектار	۲۰/۷۳۸c	۱۲/۸۲۲۱d	۷/۴۱۱۷c	۹/۹۳۵-c	۲۸/۳۰۵-b	۲۱/۵۳۲c	۱۹/۰۲۵-c	۲۱/۰۷۵-c

*-اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی دار در تیمار ۵ درصد نمی باشند.

جدول ۵ - مقایسه میانگین تیمارهای مختلف علفکش‌های کاربردی در الگوهای مختلف کاشت بر تراکم علفهای هرز پهنه برگ (تعداد در مترمربع) ۳۵ و ۵۰ روز پس از سمپاشی

علفکش	۳۵ روز پس از سمپاشی					۵۰ روز پس از سمپاشی				
	تک ردیفه با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۲۵	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۵۰	تک ردیفه با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۲۵	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۵۰	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۲۵	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۵۰	
شاهد بدون علف هرز	./.....f*	./.....e	./.....d	./.....d	./.....g	./.....e	./.....f	./.....f	./.....f	
شاهد با علف هرز										
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
آترازین در هکتار + ۰/۸ کیلوگرم ماده موثره	۱۰/۵۰۰.a	۶/۶۲۵.a	۳/۶۲۵.a	۵/۲۵۰.a	۱۵/۳۳۳.a	۱۱/۰۶۲۵a	۸/۸۸۷۵a	۱۰/۱۲۵۰.a		
کیلوگرم ماده موثره										
ارادیکان در هکتار										
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
آترازین در هکتار + ۰/۸ کیلوگرم ماده موثره	۴/۱۰.b	۵/۶۶۶yb	۳/۶۲۵.a	۴/۸۰۹.a	۸/۲۵۰.b	۷/۶۲۵.b	۶/۵۰۰.b	۷/۵۰۰.b		
کیلوگرم ماده موثره										
ارادیکان در هکتار										
کیلوگرم ماده موثره										
آترازین در هکتار + ۰/۸ کیلوگرم ماده موثره	۴/۹۲.d	۳/۷۵۰.c	۲/۱۲۵.c	۲/۸۷۵.c	۳/۸۷۵.e	۳/۰۰۰.d	۲/۳۱۲۵d	۲/۵۰۰.e		
کیلوگرم ماده موثره										
ارادیکان در هکتار										
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
آترازین در هکتار + ۰/۸ کیلوگرم ماده موثره	۲/۴.d	۲/۵۰۰.d	۲/۰۰۰.c	۲/۵۰۰.c	۲/۷۷۰.yf	۲/۲۵۰.d	۱/۵۰۰.e	۲/۱۲۵.e		
کیلوگرم ماده موثره آلاکلر										
در هکتار	۵/۶۶۶yc	۴/۶۱۴c	۲/۹۹۴۹b	۴/۵۰۰.ab	۶/۸۷۵.c	۵/۶۲۵.c	۳/۵۰۰.c	۵/۵۰۰.c		
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
آرادیکان در هکتار	۴/۵۰۰.d	۴/۲۵۰.c	۲/۵۰۰.bc	۳/۷۹۱yb	۴/۸۷۵.d	۴/۶۲۵.c	۳/۵۰۰.c	۳/۷۹۱yd		

*-اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی دار در تیمار ۵ درصد نمی‌باشند.

جدول ۶- مقایسه میانگین تیمارهای مختلف علف‌کش‌های کاربردی در الگوهای مختلف کاشت بر وزن خشک علف‌های هرز پهنه برگ (گرم در مترمربع) و ۵۰ روز پس از سمپاشی

علف‌کش	۳۵ روز پس از سمپاشی					۵۰ روز پس از سمپاشی				
	تک ردیفه با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۲۵	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۵۰	تک ردیفه با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم معمول	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۲۵	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۵۰	دو ردیفه زیگزاگ با تراکم ٪۵۰	
	شاهد بدون علف هرز	۰/۰۰۰..e*	۰/۰۰۰..e	۰/۰۰۰..c	۰/۰۰۰..e	۰/۰۰۰..e	۰/۰۰۰..e	۰/۰۰۰..e	۰/۰۰۰..e	۰/۰۰۰..f
شاهد با علف هرز										
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
۳/۲۸ آتزازین در هکتار + کیلوگرم ماده موثره	۴۹/۹۴۷۵a	۳۱/۸۸۶۳a	۱۰/۷۸۲۵a	۱۵/۶۱۲۹a	۴۰/۲۵۰..a	۳۵/۱۸۷۵a	۲۹/۵۰۰..a	۳۰/۶۲۵..a		
کیلوگرم ماده موثره										
اردیکان در هکتار										
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
۴/۱۰ آتزازین در هکتار + کیلوگرم ماده موثره	۱۹/۹۲۵..b	۱۴/۴۳۳..b	۷/۸۶۵۴b	۱۳/۹۰۴..b	۳۱/۵۰۰..b	۲۹/۵۰۰..b	۲۰/۵۰۰..b	۲۴/۳۷۵..b		
کیلوگرم ماده موثره										
اردیکان در هکتار										
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
۴/۹۲ آتزازین در هکتار + کیلوگرم ماده موثره	۱۲/۵۲۸۸c	۱۰/۷۹۰..c	۶/۵۵۸۸b	۱۰/۶۶۳..c	۲۴/۵۰۰..c	۱۱/۵۰۰..d	۶/۶۲۵..d	۹/۶۲۵..d		
کیلوگرم ماده موثره										
اردیکان در هکتار										
۱ کیلوگرم ماده موثره		۸/۷۸۸۸d	۶/۵۳۷۶d	۶/۴۴۳..b	۶/۵۳۷۶d	۱۴/۵۰۰..d	۱۰/۵۰۰..d	۶/۳۷۵..d	۸/۵۶۲۵e	
۰/۸ کیلوگرم ماده موثره										
۲/۴ آتزازین در هکتار + کیلوگرم ماده موثره آلاکلر	۱۴/۴۳۳..c	۱۴/۰۴۷..b	۷/۷۴۵۵b	۱۲/۵۳۶۹b	۳۰/۲۵۰..b	۲۸/۶۰۰..b	۱۲/۶۲۵..c	۲۳/۵۰۰..b		
کیلوگرم ماده موثره آلاکلر										
در هکتار										
۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره										
اردیکان در هکتار		۱۲/۷۶۱..c	۱۱/۱۷۰..c	۶/۵۸۷۹b	۱۰/۹۲۷۵c	۳۰/۲۵۰..b	۱۷/۵۰۰..c	۱۱/۷۵۰..c	۱۴/۵۰۰..c	

* اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی‌دار در تیمار ۵ درصد نمی‌باشند.

جدول ۷- مقایسه میانگین نمره واکنش علف‌های هرز به علف‌کش‌های کاربردی در الگوهای مختلف کاشت ذرت بر اساس شاخص EWRC در ۳۵ روز پس از سمپاشی.

علف‌کش	تک ردهه زیگزاگ با معمول	دو ردهه زیگزاگ با تراکم	دو ردهه زیگزاگ با تراکم معمول	دو ردهه زیگزاگ با تراکم %۲۵	دو ردهه زیگزاگ با تراکم %۵۰
شاهد بدون علف هرز	۱۰۰...a	۱۰۰...a	۱۰۰...a	۱۰۰...a	۱۰۰...a
۳/۲۸ +۰/۸ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار	۶۷/۵۰..d*	۷۱/۵۶۳d	۸۲/۵۰..d	۸۱/۸۱۳d	
۴/۱۰ +۰/۸ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار	۸۸/۱۲۵ab	۹۲/۱۲۵b	۹۷/۰۰..b	۹۳/۹۳۸bc	
۴/۹۲ +۰/۸ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار	۸۹/۵۰..ab	۹۲/۲۵..b	۹۷/۹۱۳ab	۹۶/۷۵..ab	
۲/۴ +۰/۸ کیلوگرم ماده موثره آترازین در هکتار	۷۱/۸۷۵cd	۷۲/۸۵۸d	۹۱/۳۷۵c	۸۸/۸۷۵c	
۴/۹۲ کیلوگرم ماده موثره آلاتکلر در هکتار	۸۲/۱۲۵bc	۸۶/۹۳۸c	۹۱/۵۰..c	۹۱/۵۰..bc	

*-اعداد دارای حروف مشابه در هر ستون، بر اساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی‌دار در سطح ۵ درصد نمی‌باشند.

منابع

- Abdullah, G. H., I. Ahmad Khan, and M. Munir. 2007. Effect of planting methods and herbicides on yield and yield components of maize. *Pakistan Journal. Weed Science Research.* 13: 39-48.
- Ali, R., S. K. Khalil, S. M. Raza, and H. Khan. 2003. Effect of herbicides and row spacing on maize (*Zea mays L.*). *Pakistan Journal. Weed Science Research.* 9: 171-178.
- Bauman, D. T. 2001. Competitive suppression of weeds in a leek-celery intercropping system. Ph.D. Thesis. Wageningen Agricultural University. The Netherlands.
- Begna, S. H., R. I. Hamilton, L. M. Dwyer, D. W. Stewart, D. Cloutier, L. Assemat, K. Foroutan Pour, and D. L. Smith. 2001. Weed biomass production response to plant spacing and corn hybrids differing in canopy architecture. *Weed Technology.* 15: 647-653.
- Blackshaw, R. E., J. T. O'Donovan, K. N. Harker, G. W. Clayton, and R. N. Stougaard. 2006. Reduced herbicide doses in field crops: A review. *Weed Biology and Management.* 6: 10-17.
- Buhler, D. D. 2002. Challenges and opportunities for integrated weed management. *Weed Science.* 50: 273-280.
- Cathead, R. J., and C. J. Swanton. 2004. Nitrogen management will influence threshold values of green foxtail (*Setaria viridis*) competition effects on corn growth and development. *Weed Science.* 51: 975-986.
- Eskandari, A. 2006. Investigating effects of different planting pattern on decline of herbicide consumption and weeds population. MSc. Thesis. Tehran University.
- Finck, C. 2003. Twin rows take to field. *Farm Journal. (Midwest/Central edition).* Philadelphia. 127: 8-15.
- Gardiol, J. M., L. A. Serio, and A. I. Della Maggiora. 2003. Modelling evapotranspiration of corn under different plant densities. *Journal of Hydrology.* 271: 188-196.
- George, A. 2002. Principles of crop production. Prentice-Hall of India. New dehli-110 001.
- Gozebenli, H., M. Kilinc, O. Sener, and O. Konuskan. 2004. Effects of single and twin row planting on yield and yield component in maize. *Asian Journal of Plant Science.* 3: 203-206.
- Grichard, W. J., B. A. Besler, and K. D. Brewer. 2004. Effect of row spacing and herbicide dose on weed control and grain sorghum yield. *Crop Protection.* 23: 263-267.
- Harbur, M. M., and M. D. K. Owen. 2004. Light and growth rate effects on crop and weed responses to nitrogen. *Weed Science.* 52: 578-583.
- Heatherly, L. G., S. R. Spurlock, and C. D. Elmore. 2001. Row width and weed management systems for conventional soybean plantings in midsouthern USA. *Agronomy Journal.* 93: 1210-1220.
- Lemerle, D., G. S. Gill, C. E. Murphy, S. R. Walker, R. D. Cousens, and S. Mokhtari. 2001. Genetic improvement and agronomy for enhanced wheat competitiveness with weeds. *Australian Journal. Agriculture Research.* 52: 527-548.
- Maddonni, G. A., M. E. Otegui, and A. G. Cirilo. 2001. Plant population density, row spacing and hybrid effects on maize canopy architecture and light attenuation. *Field Crops Research.* 71: 183-193.

- 18- Mohler, C. L. 2001. Enhancing the competitive ability of crops. In: Ecological Management of Agricultural Weeds (ed. by M. Liebman, C. L. Mohler, and C. P. Staver). Cambridge University Press, Cambridge. Pp. 269-322.
- 19- National Agricultural Statistics Service [NASS]. 2002. Agricultural Chemical Usage. Washington, DC: Agricultural Statistics Board and USDA.
- 20- Rajcan, I., and C. J. Swanton. 2001. Understanding maize-weed competition: resource competition, light quality and whole plant. *Field Crop Reseach*. 71: 139-150.
- 21- Rezai, G. 2009. Knowing EWRC. Available. <http://weediness.blogfa.com/8802.aspx>.
- 22- Roggenkamp, G. J., S. C. Mason, and A. R. Martin. 2000. Velvetleaf (*Abutilon theophrasti*) and green foxtail (*Setaria viridis*) response to corn (*Zea mays*) hybrid. *Weed Technology*. 14: 304-311.
- 23- Shapiro, C. A., and C. S. Wortmann. 2006. Corn response to nitrogen rate, row spacing and plant density in eastern Nebraska. *Agronomy Journal*. 98: 529-535.
- 24- Stewart, G. 2000. Twin row corn. Availal. <http://www.ontariocorn.org> {18 June 2008}.
- 25- Tingle, C.H., G. L. Steele, and J. M. Chandler. 2003. Competition and control of smellmelon (*Cucumis melo* var. *dudaim* Naud) in cotton. *Weed Science*. 51: 586-591.
- 26- Weiner, J., H. W. Griepentorg, and L. Kristensen. 2001. Suppression of weed by spring wheat (*Triticum aestivum*) increase with crop density and spatial uniformity. *Applied Ecology journal*. 38: 784-790.
- 27- Williams, M. M., and J. B. Masiunas. 2006. Functional relationships between giant ragweed (*Ambrosia trifida*) interference and sweet corn yield and ear traits. *Weed Science*. 54: 948-953.