



اثر زمان محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی نانو بر صفات کمی و کیفی در ۱۸ ژنوتیپ گندم دوروم دیم

یحیی فیروزی شاهعلی بگلو^۱ - حسن فیضی^{۲*} - اصغر مهربان^۳ - مسعود علی پناه^۴

تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۰۷/۲۵

چکیده

با توجه به کمبود عناصر کم‌صرف و نیاز مبرم به غنی‌سازی زیستی در گیاهان مهم و راهبردی در تعزیز جامعه انسانی همچون گندم، ضرورت ایجاد می‌کند تا هرگونه راهکاری برای بهینه کردن تولید و کیفیت این محصول مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر یکی از راههای ساده برای نیل به خودکفایی و جامعه‌ای سالم و تندرست، اضافه کردن عناصر کم‌صرف به خاک و یا مصرف آن به صورت محلول‌پاشی می‌باشد. به منظور بررسی اثرات زمان‌های مختلف محلول‌پاشی نانو کلات سوپرپلاس بر عملکرد و اجزای آن و درصد پروتئین دانه در ارقام و لاین‌های گندم دوروم دیم، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۳-۹۴ در منطقه مغان به صورت اسپیلت‌پلات بر پایه طرح بلوك‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل زمان محلول‌پاشی کود نانو کلات سوپرپلاس (شرکت بیوزر) با غلظت دو در هزار در چهار زمان (زمان پنجهزمنی، خوشده‌ی، دانه‌بندی و شاهد عدم محلول‌پاشی) به عنوان عامل اصلی و رقم و لاین‌های گندم دوروم در ۱۸ سطح به عنوان عامل فرعی بودند. صفات موردنظری شامل طول بوته، تعداد پنجه و پنجه بارور، طول پدانکل، طول خوشة، تعداد سنبلاچه، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در خوشة، وزن کاه، وزن دانه در کل بوته، وزن کل بوته، تعداد روز تا ظهور سنبله، تعداد روز تا رسیدن، وزن هزار دانه، درصد پروتئین و عملکرد دانه بودند. نتایج نشان داد که زمان محلول‌پاشی اثر معنی‌داری بر صفات موردنظری داشت. محلول‌پاشی در زمان پنجهزمنی مناسب‌ترین اثر و عدم محلول‌پاشی (شاهد) کمترین تأثیر معنی‌دار بر صفات اندازه‌گیری شده را داشت. ارقام نیز از نظر صفات موردنظری تفاوت معنی‌داری با هم نشان دادند. همچنین اثر مقابله زمان محلول‌پاشی × ارقام مختلف نشان داد که بیشترین درصد پروتئین و عملکرد دانه در محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی در مرحله پنجهزمنی بهترتبی در لاین‌های L5 (۱۲/۲۳ درصد) و L16 (۲۹/۴۸ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد. همچنین درصد پروتئین در مرحله پنجهزمنی در رقیم دهدشت (۹/۱۰ درصد) و کمترین عملکرد دانه در عدم محلول‌پاشی در رقم سیمره و مرحله دانه‌بندی در لاین L7 (۷۷۱/۷۰ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد.

واژه‌های کلیدی: اجزای عملکرد، پروتئین دانه، محلول‌پاشی، لاین، غلات

عناصر کم‌صرف رنج می‌برند، بنابراین نیاز به غنی‌سازی زیستی در گیاه مهمی همچون گندم ایجاد می‌کند تا هرگونه راهکاری برای بهینه کردن تولید و کیفیت این محصول مورد ارزیابی قرار گیرد از طرف دیگر یکی از راههای ساده برای نیل به خودکفایی و جامعه‌ای سالم و تندرست، اضافه کردن عناصر کم‌صرف به خاک و یا مصرف آن به صورت محلول‌پاشی می‌باشد. مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی مانند نیتروژن و فسفر، عدم کاربرد کودهای دارای عناصر کم‌صرف، وجود خاک‌های آهکی با ماده آلی کم و کشت‌متناوب اراضی سبب تشدید کمبود عناصر کم‌صرف در خاک‌های زیر کشت غلات کشور گردیده است. کمبود عنصر روی هم به عنوان پنجمین عامل بیماری و مرگ در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود (Li et al., 2015). بیشتر از ۲۰ درصد مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال در دنیا به کمبود آهن و روی نسبت داده می‌شود (Velu et al., 2014).

امروزه استفاده از کودهای نانو در کشاورزی نویدبخش رهایی از

مقدمه

ریزمغذی‌ها عناصر معدنی ضروری موردنیاز برای گیاه و توسعه جوامع انسانی است. با این حال، عناصر کم‌صرف اغلب در خاک، محصول و مواد غذایی وجود ندارد. بنابراین ریزمغذی‌ها به عنوان کود برای افزایش بهره‌وری محصول، به ویژه هنگامی که استفاده از کودهای معمولی (NPK)، مؤثر نیست استفاده می‌شود (Dimkpa et al., 2016). با توجه به اینکه بیش از ۳ میلیارد نفر در دنیا از کمبود

- دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
- استادیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اردبیل (معان)

- دانشیار گروه تولیدات گیاهی، دانشگاه تربت حیدریه
- نویسنده مسئول: (Email: h.feizi@torbath.ac.ir)
- DOI: 10.22067/gsc.v16i1.59050

گرفته شد و کشت بعد از انجام عملیات متداول تهیه زمین، پخش کود، دیسک، لولرکشی و فاروکشی با بذرکار مخصوص کشت آزمایشات ویتراشتایگر (مدل کوچک و آزمایشگاهی دستگاه‌های بذرکار دقیق است که به منظور کاشت بذر غلات در کرت‌های کوچک و آزمایشی جهت مراکز تحقیقاتی ساخته شده است و در اغلب مراکز تحقیقاتی وجود داشته و از آن در پیاده‌سازی طرح‌ها استفاده می‌شود) انجام گرفت. میزان کود مصرفی تحت شرایط دیم بر اساس عرف مناطق دیم کاری منطقه و نیاز خاک به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم به صورت پایه و ۵۰ کیلوگرم در هکتار کود اوره به صورت سرک مصرف شد. در این بررسی تیمارهای آزمایشی شامل زمان محلول‌پاشی کود نانو کلات سوپر پلاس (شرکت بیوزر) با غلظت دو در هزار در چهار در محلول زمان (زمان پنجه‌زنی، ظهرور سنبله، دانه‌بندی و شاهد (عدم محلول‌پاشی)) به عنوان عامل اصلی ۱۸ ژنتیکی گندم دوروم (انتخابی از آزمایشات بین‌المللی مرکز تحقیقات) به عنوان عامل فرعی در قالب طرح اسپلیت‌پلات بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. مساحت هر کرت ۶۰ خط به طول شش متر و فواصل خطوط ۲۰ سانتی‌متر و فاصله ۷/۲ بین بذرها حدود ۳ سانتی‌متر) مترمربع و مساحت کرت قبل برداشت ۶ مترمربع بود. محلول‌پاشی کود نانو کلات سوپر پلاس بنا بر میزان پیشنهادی شرکت سازنده به میزان دو در هزار و بر اساس سطح مورد نظر، محاسبه و تهیه گردید. این کود ترکیبی غنی از عناصر میکرو، بهویژه آهن٪۸، روی٪۶ و منگنز٪۴ بود. علاوه بر آن حاوی عناصر دیگر نظیر منیزیم، بور، مس، مولیبدن، کلسیم٪۲ و اسیدهای آمینه: هیدروکسی پرولین، اسید اسپارتیک، ترئونین، سرین، پروولین، گلوتامیک اسید، گلیسین، آلانین، آرژینین، متیونین، ایزوولوسین، لوسین، تیروزین، فنیل آلانین، لیزین، هیستیدین، والین، سیستئین، آسپاراژین و تریپتوфан (۱٪)، اسید آسکوربیک (۰/۳٪) بود. نوع کلات و نانو ذرات استفاده شده در این کود به گونه‌ای بود که قابلیت استفاده در شرایط محلول‌پاشی و کودآبیاری را با ارتیخشی بالا داشت و در هر مرحله از تیمارهای موردنظر محلول‌پاشی انجام شد.

همچنین در زمان برداشت از هر کرت تعداد ۱۰ بوته انتخاب شده و پس از انتقال به آزمایشگاه صفاتی همچون ارتفاع بوته، طول پدانکل، تعداد پنجه‌ها و پنجه‌های بارور، طول سنبله، تعداد سنبله‌ها در سنبله، تعداد دانه در سنبله، وزن دانه در سنبله، عملکرد دانه در بوته اندازه‌گیری شد. برای اندازه‌گیری عملکرد دانه ۰/۵ متر از انتهای خطوط کشت به عنوان اثرات حاشیه‌ای حذف و برداشت از سطح شش مترمربع انجام و توزین گردید. همچنین از هر کرت آزمایشی یک نمونه ۱/۵ کیلوگرمی به آزمایشگاه شیمی و تکنولوژی غلات ارسال شد تا درصد پروتئین هر نمونه تعیین گردد. در نهایت داده‌های به دست آمده مرتب و پردازش شده و با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و MSTATC تجزیه و تحلیل آماری و مقایسه میانگین‌ها با

محدودیت‌های فنی استفاده از کودها شده است. نانو کودها به دلیل آزادسازی آهسته و کنترل شده عناصر در ناحیه مناسبی از ریشه، راندمان مصرف بالایی دارند. بهمود کارایی جذب، افزایش راندمان به دلیل سرعت جذب بیشتر، عدم اثلاف کودها به وسیله آبشویی و جذب کامل کود گیاه به دلیل رهاسازی عناصر غذایی با سرعت مطلوب در تمام فصل رشد، از ویژگی‌های مطلوب این کودها محسوب می‌شود (Alavi Matin *et al.*, 2015). سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن گندم دوروم در ایران تولید می‌شود که ۶۰ درصد آن برای تولید ماکارونی قابل استحصال است و بقیه نیاز داخلی از خارج وارد می‌شود. سرانه مصرف ماکارونی در کشور پنج کیلوگرم در سال است (حدود یک چهارم یک فرد اروپایی) و با توجه به وجود مواد مغذی چون گلوتن و بتاکاروتون در ماکارونی و ضایعات بسیار پایین آن، لازم است که میزان مصرف آن افزایش یابد. بدین منظور دولت با اعمال سیاست‌های تشویقی چون نرخ بالاتر خرید گندم دوروم (حدود ۶٪) نسبت به گندم نان و ارائه جوايز صادراتی به صادرکنندگان این محصول، سعی در افزایش تولید و صادرات آن دارد (Emam, 2011). فرضی اصل و ولیزاده (Feizi Asl and Valizadeh, 2004) حد بحرانی آهن، منگنز و روی را در خاک‌های گندم دیم شمال غرب را به ترتیب ۸/۸ و ۱۱/۳ و ۸۸/۰ میلی‌گرم در کیلوگرم، گزارش نمودند. همچنین حمیدی اصیل و همکاران (Hamidi Asil *et al.*, 2014) حد بحرانی آهن، روی، مس، منگنز و بر را در منطقه قزوین به ترتیب ۱/۶۵، ۹/۱، ۰/۹ و ۳/۷۵ میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک تعیین کردند. در دیگر مطالعه سیلیسپور (Seilsepour, 2007) با مصرف تואم ۸۶۷ کودهای آهن و روی میزان عملکرد گندم به طور متوسط کیلوگرم افزایش یافت. با توجه به اهمیت گندم دوروم دیم و نیاز کارخانه‌های ماکارونی و حتی مصرف مستقیم به صورت بلغور و فریکه و جایگزین کردن مقداری از برنج وارداتی مصرفی با آن و به با توجه به اینکه تنها یک ریزمندی در فرهنگ گندم استفاده می‌شود، این پژوهش به منظور بررسی اثر محلول‌پاشی نانو کلات سوپرپلاس بر عملکرد و اجزای آن و درصد پروتئین دانه در ارقام گندم دوروم دیم منطقه پارس‌آباد مغان اجرا شد.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان واقع در ۵۹ کیلومتری جنوب غرب شهرستان پارس‌آباد مغان اجرا گردید. این منطقه دارای اقلیم نیمه‌خشک با تابستان‌های گرم و زمستان‌های کمی سرد می‌باشد که در عرض جغرافیایی ۳۹ درجه و ۴۷ دقیقه و طول جغرافیایی ۸۸ درجه و ۷۸ دقیقه و در ارتفاع ۷۸ متری سطح دریا قرار دارد. برای اجرای طرح زمینی به وسعت ۲۵۰۰ متر مربع در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی مغان که سال قبل آیش بود، در نظر

سوپرپلاس (پنجه زنی، سنبله بندی، دانه بندی و شاهد) و نیز ارقام مختلف بر طول بوته در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری داشت (جدول ۱). همچنین جدول مقایسه میانگین اثر زمان های مختلف محلول پاشی نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته با مصرف سوپر پلاس در زمان دانه بندی (۷۳/۴۴ سانتی متر) به دست آمد که نسبت به شاهد ۶/۵۰ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). سی و سه مرده و همکاران (Ziaeyian, 2006) رابطه منفی بین ارتفاع گیاه و تعداد دانه در گندم را تحت شرایط دیم گزارش کردند. همچنین عدم معنی دار بودن اثر مصرف عناصر ریز مغذی بر ارتفاع بوته نیز گزارش شده است (El-Magid *et al.*, 2000). در مطالعه دیگر المgid و همکاران (Hussain *et al.*, 2005) مشاهده کردند که محلول پاشی ریز مغذی ها (آهن، روی و منگنز) در گندم در خاک رسی ارتفاع بوته را افزایش داد. جدول مقایسه میانگین اثر زمان های مختلف محلول پاشی نشان داد که بیشترین تعداد پنجه در زمان خوش دهی (۲/۵۲ متر مربع) به دست آمد که نسبت به شاهد ۱۱۰ درصد افزایش نشان داد که با نتایج (Torun *et al.*, 2001) مطابقت دارد (جدول ۲). حسین و همکاران (Malakooti *et al.*, 2009) گزارش کردند که محلول پاشی عناصر ریز مغذی در مرحله پنجه زنی و یا مرحله آبستنی و شیری، عملکرد دانه گندم را از طریق افزایش ارتفاع بوته، تعداد دانه در هر سنبله و وزن هزار دانه افزایش می دهد. بیشترین تعداد پنجه بارور با مصرف سوپر پلاس در زمان خوش دهی (۱/۸۹ عدد) به دست آمد که نسبت به شاهد ۲۸/۵۷ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). گزارش شده است که مصرف ۴۰ کیلوگرم در هکتار روی (عنصر کم مصرف) به علاوه محلول پاشی سولفات روی با غلظت ۳ در هزار سبب افزایش تعداد پنجه های بارور در نتیجه افزایش تعداد سنبله در بوته شد (Ziaeian and Malakouti, 2001). جدول نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول پاشی سوپرپلاس و نیز ارقام مختلف بر طول پدانکل در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری داشت (جدول ۱). بیشترین طول پدانکل با مصرف سوپر پلاس در زمان پنجه زنی (۱۲/۶۷ سانتی متر) به دست آمد که نسبت به شاهد ۹/۷۹ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). بیشترین طول سنبله با مصرف سوپر پلاس در زمان پنجه زنی (۷/۳۱ سانتی متر) به دست آمد که نسبت به شاهد ۴/۴۳ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول پاشی سوپرپلاس و نیز ارقام مختلف بر تعداد سنبله در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری داشت (جدول ۱). بیشترین تعداد سنبله در با مصرف سوپر پلاس در زمان پنجه زنی (۱۴/۵۸ واحد سطح) به دست آمد که نسبت به شاهد ۷/۳۶ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). سیده و همکاران (Seadh *et al.*, 2009) افزایش تعداد سنبله در هر سنبله را با محلول پاشی روی گزارش کردند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول پاشی سوپرپلاس و نیز ارقام

استفاده از آزمون LSD پنج درصد و خوش بندی ارقام انجام شد و نتایج نهایی ارائه گردید.

نتایج و بحث

عملکرد دانه و اجزای عملکرد

عملکرد گندم و افزایش آن با اثر ترکیبی عوامل مهم رشد مانند نور، حرارت، رطوبت و تقاضه تعیین می گردد. به طور کلی برای افزایش عملکرد در واحد سطح توجه به سه موضوع تعداد سنبله در هر مترا مربع، تعداد دانه در هر سنبله و وزن هزار دانه ضرورت دارد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول پاشی و نیز ژنوتیپ های مختلف محلول پاشی نشان داد که درصد تفاوت معنی داری داشت (جدول ۱). در این مطالعه جدول مقایسه میانگین اثر زمان های مختلف محلول پاشی نشان داد که بیشترین عملکرد دانه با مصرف سوپرپلاس در زمان ظهر سنبله (۲۰۶۵ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد که نسبت به شاهد ۹۳/۵۳ درصد افزایش داشت (جدول ۲). عملکرد دانه در غلات دانه ریز ناشی از اثرات اجزای عملکرد دخیل یعنی تعداد پنجه های بارور، تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله می باشد. در گزارشی با کاربرد عناصر کم مصرف در ۱۰ استان کشور عملکرد گندم (آبی و دیم) افزایش یافت و دامنه افزایش عملکرد بین ۱۹۰۰-۳۵۰ کیلوگرم در هکتار بود (Malakooti *et al.*, 2009). همچنین در دیگر گزارش مشاهده شده که محلول پاشی روی و آهن در مقایسه با شاهد باعث افزایش عملکرد دانه و کیفیت آن می شود (Maralian, 2012). همچنین مقایسه اثر متقابل میانگین ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه در لاین ۱۶ L و در محلول پاشی در مرحله پنجه زنی (۲۹۴۸ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد که نسبت به شاهد ۷۷۱/۲۰ کیلوگرم در هکتار (۲۸۲/۰۱ درصد افزایش نشان داد (جدول ۳). همچنین کمترین عملکرد دانه در رقم سیمده در شرایط عدم محلول پاشی و نیز لاین L و در محلول پاشی در مرحله دانه بندی (۷۷۱/۲۰ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد که نسبت به شاهد ۱۰۲۳ کیلوگرم در هکتار) ۳۲/۶ درصد کاهش نشان داد (جدول ۳).

تأمین عنصر روی همراه با سایر عناصر مورد نیاز گیاه، تعداد سنبله در بوته، تعداد دانه در سنبله و در نتیجه عملکرد دانه گندم را افزایش داده و کمبود روی به دلیل افزایش پنجه های نابارور باعث می شود که در طول دوره رشد رویشی و زایشی این پنجه ها از مواد فتوسنتزی ساقه اصلی استفاده نموده و طول دوره رشد رویشی بیشتر شده و در نتیجه عملکرد دانه در واحد سطح کاهش می یابد (Rangel and Graham, 1995). وارگا و همکاران (Varga *et al.*, 2001) در آزمایشی نشان دادند که بین ارقام مختلف از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری وجود دارد.

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول پاشی

سوپرپلاس و نیز ارقام مختلف بر تعداد روز تا ظهرور سنبله^۱ (DHE) در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۱). جدول مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف محلول‌پاشی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد روز تا ظهرور سنبله با مصرف سوپرپلاس ۰/۶۳ در زمان پنجه‌زنی (روز) به دست آمد که نسبت به شاهد ۰/۷۸ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). در این بررسی جدول مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف محلول‌پاشی نشان می‌دهد که بیشترین تعداد روز تا رسیدن^۲ (DMA) با مصرف سوپرپلاس در زمان پنجه‌زنی ۰/۵۳ در روز به دست آمد که نسبت به شاهد ۰/۱۸ درصد افزایش معنی‌دار نشان داد (جدول ۲). همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول‌پاشی سوپرپلاس و نیز ارقام مختلف بر DMA در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۱). در این پژوهش جدول مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف محلول‌پاشی نشان داد که بیشترین وزن هزار دانه^۳ (TKW) با مصرف سوپرپلاس در زمان دانه‌بندی (۳۳/۵ گرم) به دست آمد که نسبت به شاهد ۰/۶۱ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول‌پاشی سوپرپلاس و نیز ارقام مختلف بر TKW در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۱).

همچنین محلول‌پاشی عنصر بر، به دلیل نقشی که در ساختن اسید مالیک و انتقال هیدرات‌های کربن و آنزیم‌ها دارد و عنصر روی، که سبب افزایش عملکرد و اجزای آن می‌شود، به همراه آهن می‌تواند باعث افزایش عملکرد دانه شود. وجود آهن در گیاه به دلیل افزایش فتوستتر باعث افزایش هیدرات‌های کربن و مواد پروتئینی می‌شود و از آن جایی که در نهایت ذخیره این مواد در دانه صورت می‌گیرد می‌توان اظهار داشت که محلول‌پاشی آهن باعث افزایش عملکرد دانه می‌شود (Tattari, 2004). کاربرد محلول‌پاشی عناصر آهن، منگنز، روی و منیزیم سبب افزایش عملکرد دانه، اجزای عملکرد و کلش و کربوهیدرات‌های دانه در گندم می‌شود (Kassab et al., 2004).

درصد پروتئین

در این تحقیق بین زمان محلول‌پاشی نانو کلات سوپرپلاس (پنجه‌زنی، خوشده‌ی، دانه‌بندی و شاهد) و نیز ارقام مختلف بر درصد پروتئین در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌دار بود (جدول ۱) و جدول مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف محلول‌پاشی نشان می‌دهد که بیشترین درصد پروتئین با مصرف سوپرپلاس در زمان پنجه‌زنی (۱۰/۸۵ درصد) به دست آمد که نسبت به شاهد ۳/۳۳ درصد

مختلف بر تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۱). تعداد دانه در سنبله یکی از اجزای مهم عملکرد در گندم بوده و تحت شرایط مختلف محیطی می‌تواند بر عملکرد دانه تأثیر متفاوتی داشته باشد. بیشترین تعداد دانه در سنبله با مصرف سوپرپلاس در زمان پنجه‌زنی (۳۳/۸۸ دانه) به دست آمد که نسبت به شاهد ۲۳/۹۷ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). پهلوان راد و پسرک لی (Pahlavan-Rad and Pessarakli, 2009) در آزمایشی با کاربرد روی، آهن و منگنز بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم نشان دادند که اثر این عناصر بر صفت تعداد دانه در سنبله اثر معنی‌داری داشت. همچنین در گزارش‌های متعدد ارائه شده این مؤلفه را تاحدوی جزء ثابت عملکرد دانه دانسته‌اند، با این حال شرایط محیطی و زراعی بر پتانسیل آن تأثیر دارد (Fathi et al., 2002).

بیشترین وزن دانه در خوشه با مصرف سوپرپلاس در زمان پنجه‌زنی (۱/۲۷ گرم) به دست آمد که نسبت به شاهد ۲۷ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). نتایج تحقیقات همانترانجان و گرجی (Hemantaranjan and Grag, 1988) نشان داد که مصرف آهن و روی موجب افزایش معنی‌دار تعداد خوشه در متر مربع، طول خوشه و وزن هزار دانه گندم شد. این محققان اعلام نمودند که در اثر مصرف این عناصر مقدار کل کربوهیدرات‌ها، نشاسته و پروتئین دانه افزایش می‌یابد و با افزایش کربوهیدرات‌ها وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه نیز افزایش یافته و موجب افزایش عملکرد دانه می‌شود.

در مطالعه‌ای وزن دانه در سنبله دارای بیشترین اثر مستقیم مثبت بر عملکرد دانه گندم در طی چهار سال زراعی داشت (Yagdi, 2009). این صفت اثرهای غیر مستقیم مثبت را نیز بر عملکرد دانه از طریق سایر صفات وارد نمود. بیشترین وزن کاه با مصرف سوپرپلاس در زمان دانه‌بندی (۳/۱۳ کیلوگرم در مترمربع) به دست آمد که نسبت به شاهد ۳۳/۲۳ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). بیشترین وزن دانه در کل بوته با مصرف سوپرپلاس در زمان پنجه‌زنی و خوشده‌ی (۱/۸۱ گرم در متر مربع) به دست آمد که نسبت به شاهد ۳۹/۲۳ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول‌پاشی سوپرپلاس و نیز ارقام مختلف بر وزن کل بوته در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی‌داری داشت (جدول ۱). جدول مقایسه میانگین اثر زمان‌های مختلف محلول‌پاشی نشان داد که بیشترین وزن کل بوته با مصرف سوپرپلاس در زمان دانه‌بندی (۴/۹۲ کیلوگرم در مترمربع) به دست آمد که نسبت به شاهد ۲۸/۴۶ درصد افزایش نشان داد (جدول ۲). عناصر ریزمندی احتمالاً با افزایش دوام سطح سبز گیاه باعث افزایش تولید ماده خشک می‌شوند (Leilah et al., 1988). نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل، زمان محلول‌پاشی

1- Days to heading

2- Days to maturity

3-1000 kernel weight

(Farajzadeh *et al.*, 2009)

افزایش نشان داد (جدول ۲). طبق مطالعه‌ای استفاده مطلوب آهن و روی در گندم باعث افزایش میزان پروتئین دانه می‌گردد

جدول ۱- تابع تجزیه واریانس صفات مورد بررسی

Table 1 - Analysis of variance results on studied traits

میانگین تغییرات S.O.V	درجه ازدیادی d.f	Mean squares									
		وزن کاه	وزن خوشه	تعداد سنبله	تعداد دانه در سنبله	طول خوشه	طول پستانک	تعداد بینجنه	تعداد بینجنه بر روی	تعداد بینجنه	
Repetition	2	1.09	0.01	3.34	1.22	0.26	1.12	0.88	0.18	4.39	
محلول پاشی		3.58 **	0.70 n.s	422.36 **	10.33 **	0.92 n.s	13.98 **	2.51 **	3.93 **	245.01 **	
خطا اصلی											
Foliar application	3	0.35	0.01	6.52	0.39	0.20	0.72	0.10	0.29	4.91	
Mean error	6	0.35	0.01	6.52	0.39	0.20	0.72	0.10	0.29	4.91	
Cultivar	17	0.58 n.s	0.06 n.s	62.65 **	3.18 **	0.80 n.s	13.27 **	0.39 n.s	0.65 n.s	96.59 **	
محلول پاشی × رشته											
Foliar application	51	1.29 **	0.12 n.s	50.40 **	6.08 **	1.24 **	11.06 **	0.46 n.s	0.44 n.s	65.12 **	
× Cultivar											
E	136	0.40	0.02	7.24	0.66	0.20	1.68	0.15	0.22	4.14	
خطا فرعی											
تغییرات			12.1	8.6	5.7	6.3	10.86	23.2	20.4	2.8	
تغییرات CV (%)											

ns, * and **: non-significant and significant at 5 % and 1 % probability levels, respectively.

***: بهترین معنی داری در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد و ns: غیر معنی دار می باشد.

ادمه جدول ۱- نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی
Continued Table 1 – Analysis of variance results on studied traits

مانع تغییرات	S.O.V	درجه آزادی d.f	عملکرد دانه Grain yield (kg ha^{-1})	پرتوئین Pro	درصد پروتئین (%)	Mean squares					
						تعداد زن تا	تعداد دروز تا	وزن هزار دانه (گرم) TKW	رسیدن DMA	دوز تا	وزن کل بوته Total plant weight (kg ha^{-1})
Replication	2		307421.14	9.02	0.39	3.35	5.63	3.19	0.55		
محلول پاشی محلول پاشی	3		1311305.9**	1.3**	40.32**	24.04**	93.97**	13.45**			3.42**
Foliar application											
خطای محلول پاشی	6		140568.46	0.55	1.26	3.01	7.14	0.73	0.15		
Foliar application error											
Cultivar	17		57137.18**	1.52**	3.54**	9.48**	13.39**	1.39**			0.26 ns
محولی پاشی × رقمه	51		66539.88**	0.88 ns	3.55**	6.85**	14.49**	2.94**			0.47 ns
Foliar application × Cultivar											
E خطای اصلی	136		18103.81	0.77	3.62	4.98	14.26	0.73	0.13		
ضریب تغییرات	-		24.1	8.2	5.8	1.4	72.9	18.7	21.4		
CV(%)											

ns, * and **: non-significant and significant at 5 % and 1 % probability levels, respectively.
* پذیرتی معنی‌داری در سطوح احتمال ۵ و ۱ درصد و ** غیر معنی‌داری باشند.

نسبت به شاهد ۲۳/۵۴ درصد افزایش نشان داد (جدول ۳). همچنین کمترین درصد پروتئین در رقم دهدشت و در محلول پاشی در مرحله دانه‌بندی (۹/۱۰٪) بهدست آمد که نسبت به شاهد (۹/۵۳٪) ۴/۷۳ درصد کاهش نشان داد (جدول ۳).

همچنین در مطالعه بر روی تولید گندم نتایج نشان داد که میزان پروتئین دانه در عملکردهای بالا کاهش می‌باید (Bauder, 2003). همچنین نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل زمان محلول پاشی × ارقام مختلف نشان داد که بیشترین درصد پروتئین در لاین L5 و در محلول پاشی در مرحله پنجه‌زنی (۱۲/۲۳ درصد) بهدست آمد که

جدول ۲- مقایسه میانگین اثرات زمان های مختلف محلول پاشی نانو کلات سوپر پلاس بر صفات مورد مطالعه
Table 2- Means comparison of nano Super Plus application times effects on studied traits

تیمار Treatment	طول خوشة Panicle length (cm)	طول پدانکل Peduncle length (cm)	تعداد پنجه بارور Fertile tiller (No m ⁻²)	تعداد پنجه Tiller number (No m ⁻²)	طول بوته Plant height (cm)
محلول پاشی در پنجه زنی Tilling	7.31 A	12.67 A	1.472 B	2.278 A	72.51 A
محلول پاشی در خوشده Booting	7.08 B	11.65 B	1.88 A	2.519 A	72.64 A
محلول پاشی در دانه بندی Seed filling	7.17 AB	11.91 B	1.86 A	2.545A	73.44 A
عدم محلول پاشی No-Spraying	7.00 B	11.54 B	1.537 b	1.918 B	68.69 B
LSD 5%	0.2106	0.3985	0.1497	0.2532	1.043

میانگین هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی داری ندارند.

Means in each column, followed by similar letter are not significantly different at P ≤ 0.05

ادامه جدول ۲- مقایسه میانگین اثرات زمان های مختلف محلول پاشی نانو کلات سوپر پلاس بر صفات مورد مطالعه
Continued Table 2- Means comparison of nano Super Plus application times effects on studied traits

تیمار Treatment	وزن دانه در سنبله Straw weight (kg m ⁻²)	وزن کاه در خوشة Seed / panicle (g)	تعداد سنبله Grain /spike	تعداد سنبله Spikelets number (m ²)
محلول پاشی در پنجه زنی Tilling	2.85 A	1.27 A	33.88 A	14.58 A
محلول پاشی در خوشده Booting	3.03 A	1.19 B	31.94 B	14.32 A
محلول پاشی در دانه بندی Seed filling	3.13 A	1.18 B	32.12 B	14.38 A
عدم محلول پاشی No-Spraying	2.54 B	1.00 C	27.33 C	13.58 B
LSD 5%	0.2798	0.0557	1.202	0.2948

میانگین هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی داری ندارند.

Means in each column, followed by similar letter are not significantly different at P ≤ 0.05

ادامه جدول ۲- مقایسه میانگین اثرات زمان های مختلف محلول پاشی نانو کلات سوپر پلاس بر صفات مورد مطالعه
Continued Table 2- Means comparison of nano Super Plus application times effects on studied traits

تیمار Treatment	تعداد روز تا ظهرور سنبله DHE (Day)	وزن کل بوته Total plant weight (kg m ⁻²)	وزن دانه در کل بوته Seed weight / plant (g m ⁻²)
محلول پاشی در پنجه زنی Tilling	127.80 A	4.66 A	1.81 A
محلول پاشی در خوشده Booting	126.70 A	4.83 A	1.81 A
محلول پاشی در دانه بندی Seed filling	124.70 B	4.917 A	1.79 A
عدم محلول پاشی No-Spraying	127 A	3.828 B	1.30 B
LSD 5%	1.282	0.4026	0.1848

میانگین هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی داری ندارند.

Means in each column, followed by similar letter are not significantly different at P ≤ 0.05

ادامه جدول ۲- مقایسه میانگین اثرات زمان‌های مختلف محلول پاشی نانو کالات سوپر پلاس بر صفات مورد مطالعه
Continued Table 2- Means comparison of nano Super Plus application times effects on studied traits

تیمار Treatment	Grain yield (kg ha^{-1})	عملکرد دانه Pro (%)	درصد پروتئین TKW (g)	وزن هزار دانه DMA (Day)	تعداد روز تا رسیدن (Day)
محلول‌پاشی در پنجه‌زنی Tilling	2014 A	10.85 A	32.06 B	153.70 A	
محلول‌پاشی در خوش‌دهی Booting	2065 A	10.58 AB	32.20 A	152.70 A	
محلول‌پاشی در دانه‌بندی Seed filling	1547 AB	10.58 AB	33.50 A	152.90 A	
عدم محلول‌پاشی No-Spraying	1067 B	10.50 B	31.72 B	151.90 B	
LSD 5%	529.7	0.3486	0.5294	0.8175	


میانگین‌هایی که دارای حروف مشابه هستند در سطح احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌داری ندارند.

Means in each column, followed by similar letter are not significantly different at $P \leq 0.05$

نظر صفات عملکرد دانه مورد بررسی در سطح بالاتری نسبت به سایر خوش‌های قرار داشت. خوش دوم شامل ژنوتیپ‌های ۵، ۹، ۶، ۱۰، ۱۴، ۱، ۱۲، ۱۱، ۷، ۴ و ۲ است. خوش سوم شامل ژنوتیپ‌های ۱۳، ۱۵ و ۱۶ است. خوش‌های ۸، ۳، ۲ و ۱ دارای ژنوتیپ‌های ضعیف‌تر گروه‌بندی شده و معرفی می‌شوند. همچنین ژنوتیپ‌های ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نسبت به سایر ژنوتیپ‌ها از نظر درصد پروتئین برتری نسبی دارند.

گروه‌بندی لاین‌ها براساس تجزیه خوش‌های

نتایج حاصل از تجزیه کلستر (خوش‌های) ۱۸ ژنوتیپ و رقم گندم دوروم با برش دندروگرام حاصل در فاصله ۱۸ واحد نشان داد که ژنوتیپ‌ها در دو خوش با خصوصیات درون گروهی مشابه و بین گروهی غیر مشابه گروه‌بندی شدند (شکل ۱). خوش اول دارای پنج ژنوتیپ و رقم شامل ژنوتیپ‌های ۲، ۳، ۸، ۱۶ و ۱۰ و رقم دهدشت که از



شکل ۱- دندروگرام لاین‌های گندم دوروم بر مبنای صفات درصد پروتئین و عملکرد دانه
Figure 1- Dendrogram durum wheat lines based on traits, protein percentage and yield

جدول - ۳- مقایسه میانگین اثرات متقابل زمان محلول پاشی × ارقام مختلف بر صفات مورد مطالعه

Table 3- Mean comparison of interaction effects of Time spraying × Cultivars on studied traits

Treatment ۱	Cultivar	زمان محلول پاشی Spraying time	تعداد روز تا رسیدن (روز) DMA (Day)				تعداد دانه ظهوء سنبله DHE			تعداد سنبله در سنبله Grain m ²) /spike		تعداد دانه وزن کل بوته Straw Weight (kg m ²)		تعداد خوشه پانیل Panicle length		طول پداکل Peduncle length (cm)		طول چوبه Plant height (cm)	
			تیمار ۱	تیمار ۲	تیمار ۳	تیمار ۴	تیمار ۵	تیمار ۶	تیمار ۷	تیمار ۸	تیمار ۹	تیمار ۱۰	تیمار ۱۱	تیمار ۱۲	تیمار ۱۳	تیمار ۱۴	تیمار ۱۵	تیمار ۱۶	تیمار ۱۷
Tilling	L ₁	1715.	31.00	153.3	129.7	7.087	4.180	44.67	15.50	8.500	12.33	78.50							
Tilling	L ₂	2751.	32.00	151.3	131.7	4.272	2.572	37.83	14.83	8.167	12.33	76.50							
Tilling	L ₃	2282.	32.33	152.3	125.0	5.235	3.505	37.17	15.33	8.167	11.00	72.50							
Tilling	L ₄	2174.	31.33	152.3	129.3	4.397	2.510	34.17	14.67	7.833	11.17	74.33							
Tilling	L ₅	1844.	33.00	155.0	123.3	4.632	2.720	31.33	12.83	7.000	14.33	70.50							
Tilling	L ₆	866.	31.67	151.0	130.7	5.275	3.965	26.33	13.17	6.333	3.00	69.83							
Tilling	L ₇	1402.	31.33	152.7	125.0	2.795	1.772	28.50	12.67	5.833	11.00	71.50							
Tilling	L ₈	2124.	34.00	151.0	126.0	4.442	2.713	36.17	16.17	8.000	13.50	80.50							
Tilling	L ₉	1904.	32.67	156.0	126.0	4.778	3.228	34.83	17.33	7.500	16.17	72.67							
Tilling	L ₁₀	2174.	30.67	154.3	128.3	4.918	2.755	38.00	15.17	8.000	13.17	68.00							
Tilling	L ₁₁	850.7	31.33	153.0	128.7	5.240	3.025	34.17	14.00	6.500	12.50	78.17							
Tilling	L ₁₂	1478.	30.67	155.0	127.3	5.843	3.517	32.17	15.00	7.167	13.67	75.00							
Tilling	L ₁₃	2382.	32.33	156.3	126.7	4.215	2.032	29.83	15.33	7.667	13.17	66.50							
Tilling	L ₁₄	1545.	34.00	155.3	125.0	4.388	2.748	36.83	14.50	7.000	12.33	66.83							
Tilling	L ₁₅	2793.	34.00	152.0	128.0	4.082	2.598	31.17	14.33	6.667	10.17	65.33							
Tilling	L ₁₆	2948.	30.67	155.0	130.3	3.793	2.367	31.50	14.50	7.167	12.67	67.33							
Tilling	Seymareh	2382.	31.67	154.0	130.0	4.160	2.248	32.00	13.50	6.667	13.00	75.50							
Tilling	Dehdasht	2641.	32.33	152.0	130.0	4.318	2.903	33.17	13.67	7.333	12.50	75.67							
Tilling	LSD ۵%	651.7	3.073	3.605	6.097	1.383	1.022	4.344	1.307	0.724	2.093	3.287							

ادامه جدول ۳- مقایسه میانگین اثرات مختلف زمان محلول‌بازاشی × ارقام مختلف بر صفات مورد مطالعه

Continued-Table 3 - Mean comparison of interaction effects of Time spraying × Cultivars on studied traits

تیمار ۲ Treatment 2	زمان محلول‌بازاشی Spraying time	نیوار ۱ Bootling	آردکند دانه Grain yield (kg ha ⁻¹)	وزن هزار TKW (g)	تعداد روز تاریخین DMA (Day)	تعداد روز تا تاریخین DHE	وزن کل بوته Total plant weight(kg m ⁻²)	وزن کل یوته Straw Weight(kg m ⁻²)	تعداد سنبله Grain number /spike	تعداد سنبله Spikelets number (No m ⁻²)	طول خوش Panicle length	طول پستانک Peduncle length (cm)	طول چوبه Plant height (cm)
			جوانب Cultivar										
L ₁	1738.	33.67	150.7	128.0	5.110	3.215	36.33	14.33	7.333	10.50	73.50		
L ₂	2498.	31.67	152.3	127.0	5.588	3.680	29.00	14.50	7.167	10.50	69.50		
L ₃	2373.	32.67	156.0	128.0	4.700	2.942	30.67	13.67	7.167	12.17	74.83		
L ₄	1753.	34.33	150.0	128.0	5.015	3.098	35.17	13.67	7.333	13.17	75.33		
L ₅	2523.	34.67	152.7	127.0	4.273	2.672	42.83	15.33	7.167	8.667	68.00		
L ₆	2209.	32.67	152.3	125.7	4.340	2.640	31.00	13.83	7.333	12.33	75.17		
L ₇	2563.	33.67	154.0	127.7	4.343	2.643	32.67	13.83	7.333	12.33	75.17		
L ₈	2043.	33.67	152.3	127.3	6.075	3.727	30.50	14.83	7.167	14.83	74.17		
L ₉	2380.	35.00	153.7	127.0	4.600	2.888	32.67	13.33	6.833	12.00	76.83		
L ₁₀	2361.	35.33	151.0	124.0	5.130	3.117	33.83	15.67	7.333	10.33	73.67		
L ₁₁	2203.	30.67	150.7	125.3	5.412	3.558	33.17	13.67	7.000	14.33	73.00		
L ₁₂	2301.	33.00	151.7	124.7	2.438	1.718	21.17	11.83	6.167	8.00	60.83		
L ₁₃	1093.	33.00	154.7	126.7	6.248	3.938	33.00	14.83	7.333	10.00	71.33		
L ₁₄	1956.	33.00	153.7	127.0	6.242	3.893	33.00	14.83	7.167	14.83	81.17		
L ₁₅	1507.	33.67	152.3	127.3	4.630	2.750	24.83	13.83	6.833	12.17	70.00		
L ₁₆	1786.	31.67	154.0	126.3	3.173	2.003	32.00	16.00	6.667	11.17	66.83		
Seymareh	1916.	33.00	154.7	127.3	5.307	3.522	27.67	15.00	7.333	11.33	69.00		
Dehdasht	2031.	32.33	151.7	125.7	4.330	2.542	35.33	14.83	6.833	11.00	79.17		
LSD 5%	651.7	3.073	3.605	6.097	1.383	1.022	4.344	1.307	0.724	2.093	3.287		

ادامه جدول ۳ مقایسه میانگین اثرات متقابل زمان محلول پاشی × ارقام مختلف بر صفات مردمطالعه

Continued Table 3 - Mean comparison of interaction effects of Time spraying \times Cultivars on studied traits

ادامه جدول ۳- مقایسه میانگین اثرات مختلف زمان محلول‌بازی × ارقام مختلف بر صفات محصول مطالعه

Continued Table 3 - Mean comparison of interaction effects of Time spraying × Cultivars on studied traits

تیمار ۴ Treatment 4	زمان محلول پاشی	Cultivar	Spraying time	عدن هزار Grain yield (kg ha ⁻¹)	عدن هزار DWE (g)	عدن هزار DHE (Day)	عدن هزار TKW (g)	عدن کاه Straw Weight/kg m ⁻²)	وزن کاه Total plant weigh(kg/m ²)	عدن کاه Panicle length (No m ⁻²)	طول پستانکی Peduncle length (cm)	طول بوله Plant height (cm)
				تعداد روز تا رسیدن DMA	تعداد روز تا ظفور سنبله DHE	تعداد دانه در سنبله Grain /spike	تعداد دانه وزن کاه Panicle length (No m ⁻²)	تعداد دانه وزن کاه Straw Weight/kg m ⁻²)	تعداد دانه وزن کاه Panicle length (No m ⁻²)	طول خوش Peduncle length (cm)	طول بوله Plant height (cm)	
Control	شاهد	L ₁	1111.	31.67	150.0	125.7	4.280	2.767	30.33	14.83	7.833	9.833
Control	شاهد	L ₂	1196.	31.00	152.3	126.3	3.727	2.432	30.50	13.00	6.833	10.00
Control	شاهد	L ₃	1584.	32.00	150.7	129.3	4.417	2.985	25.67	13.17	7.333	65.33
Control	شاهد	L ₄	1030.	32.00	152.3	125.7	4.968	3.218	32.50	14.50	6.500	12.50
Control	شاهد	L ₅	1065.	30.67	150.7	128.0	3.107	2.200	24.33	12.83	6.500	13.67
Control	شاهد	L ₆	858.0	32.33	152.7	126.3	3.318	2.238	26.00	18.17	8.333	8.667
Control	شاهد	L ₇	1023.	31.67	152.0	131.3	2.532	1.613	26.33	12.33	6.333	11.83
Control	شاهد	L ₈	1734.	31.33	151.0	130.3	2.862	1.838	23.00	9.833	5.167	11.50
Control	شاهد	L ₉	1341.	32.00	153.0	129.7	4.518	3.015	27.50	14.50	7.167	10.33
Control	شاهد	L ₁₀	1096.	31.67	151.0	124.3	3.355	2.240	26.17	13.33	7.167	15.17
Control	شاهد	L ₁₁	827.7	31.67	153.3	127.0	3.128	2.122	28.67	14.17	6.500	7.333
Control	شاهد	L ₁₂	1032.	31.67	151.7	131.0	5.192	3.358	29.33	14.67	7.833	14.33
Control	شاهد	L ₁₃	949.3	32.67	151.0	127.3	3.577	2.687	21.83	14.00	7.333	13.17
Control	شاهد	L ₁₄	1013.	31.67	151.3	123.3	3.743	2.472	25.83	13.83	7.000	12.50
Control	شاهد	L ₁₅	880.3	31.33	151.0	124.3	3.362	2.093	29.33	12.17	6.667	8.833
Control	شاهد	L ₁₆	771.7	33.33	153.3	125.0	3.903	2.485	26.00	12.33	6.833	13.00
Control	شاهد	Seymareh	775.7	31.33	150.7	124.0	3.262	2.138	24.83	10.83	6.333	13.00
Control	شاهد	Dehdashit	926.0	31.00	155.3	127.3	5.648	3.872	33.83	16.00	8.333	14.67
		LSD 5%	651.7	3.073	3.605	6.097	1.383	1.022	4.344	1.307	0.724	2.093
												3.287

میانگین‌های که در هر سوتون دارای حروف مشابه هستند در مطلع احتمال پنج درصد اختلاف معنی‌دارند.
Means in each column, followed by similar letter are not significantly different at $P \leq 0.05$

نتیجه‌گیری

مزارع گندم دوروم با نانو کلات سوپر پلاس حداقل در مراحل پنجه‌دهی و رسیدگی دانه صورت گیرد. بنابراین، به نظر می‌رسد که استفاده از نانو کلات سوپرپلاس ZFM (روی، آهن، منگنز) که شامل عناصر میکرو با اسیدهای آمینه به عنوان منبع ازت و با اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی می‌تواند بسیار مؤثر باشد و می‌تواند به طور قابل توجهی عملکرد و اجزای عملکرد و درصد پروتئین را در گندم دوروم دیم افزایش دهد.

سپاسگزاری

این تحقیق با حمایت مالی دانشگاه تربت حیدریه انجام شده است که بدین وسیله قدردانی و تشکر می‌شود.

محلول پاشی عناصر ریزمغذی (سوپر پلاس) سبب افزایش عملکرد دانه و اجزای عملکرد گندم دوروم گردید و با توجه به نتایج آزمایش بهترین و مناسب‌ترین زمان محلول پاشی سوپر پلاس برای ارقم گندم دوروم دیم در زمان پنجه‌زنی بود و در بین ارقام بیشترین درصد پروتئین و عملکرد دانه در مرحله پنجه‌زنی بهترین بود (لاین‌های L₅ ۱۲/۲۳ درصد) و L₁₆ (۲۹۴۸ کیلوگرم در هکتار) به دست آمد، بنابراین این لاین‌ها پتانسیل جایگزینی با ارقام موجود را دارند. تکرار این پژوهش طی چند سال و همچنین در مناطق دیگر نیز می‌تواند در تأیید نتایج حاصل مؤثر باشد. با توجه به کمبود روی و آهن در سطح وسیعی از افراد جامعه پیشنهاد می‌شود محلول پاشی

References

1. Alavi Matin, S. M., Rahnama, A., and Meskarbashi, M. 2015. Effect of Type and rate of potassium fertilizer on agronomic characteristics of two cultivars durum wheat under saline stress. Research in Agricultural Science 2 (1): 177-188. (in Persian with English abstract).
2. Bauder, J., 2003. Wheat production. Montana State University. Water Quality and Irrigation Management web site.
3. Dimkpa, C. O., and Bindraban, P. S. 2016. Fortification of micronutrients for efficient agronomic production: a review. Agronomy for Sustainable Development 36 (1): 1-26.
4. El-Magid, A. A. A., Knany, R. E., and El-Fotoh, H. G. A. 2000. Effect of foliar application of some micronutrients on wheat yield and quality. Annals of Agricultural Science Cairo 1: 301-313.
5. Emam, Y. 2011. Cereal Production, Shiraz University Press. Fourth edition. 190 pp.
6. Farajzadeh Memari Tabrizi, E., Yarnia, M., Khorshidi, M. B., and Ahmadzadeh, V. 2009. Effect of micronutrients and their application method on yield, crop growth rate and net assimilation rate of corn cv. Jeta. Journal of Food, Agriculture and Environment 7 (2): 611-615.
7. Fathi, G., Mojedam, M., Siadat, S. A., and Mohammadi, G. N. 2002. Effect of Different Levels of Nitrogen and Cutting Time on Grain and Forage Yield of Karoon Cultiver of Barley. JWSS-Isfahan University of Technology, 5 (4): 97-106.
8. Feizi Asl, V., and Valizadeh, Gh. R. 2004. Effects of phosphorus and zinc fertilizer applications on nutrient concentrations in plant and grain yield in cv. Sardari (*Triticum aestivum* L.) under dryland conditions. Iranian Journal of Crop Sciences 6 (3): 223-238.
9. Gharachorloo, M. 2011. Management system designed to monitor the quality of wheat. Grain Research Center, (in Persian).
10. Hemantaranjan, A., and O. K. Garg. 1988. Iron and zinc fertilization with reference to the grain quality of *Triticum aestivum* L. J. Plant Nutr. 11: 1439-1450.
11. Hamidi Asil, S., Mostashari, M., and Moez Ardalan, M. 2014. A review of the effects of the sition of some of the micro elements and the determination of the critical level on wheat in the city of Qazvin. Iranian Journal of Agronomy and Plant Breeding 9 (4): 39-46.
12. Hussain, N., Khan, M. A., and Javad, M. A., 2005. Effect of foliar application of plant micronutrient mixture on growth and yield of wheat (*Triticum aestivum* L.). Pakistan Journal of Biological Sciences 8 (8): 1096- 1099.
13. Kassab, O. M., Zeing, H. A. E., and Ibrahim, M. M. 2004. Effect of water deficit and micronutrients foliar application on the productivity of wheat plants. Minufiya J. Agric. Res., 29:925-932.
14. Leilah, A. A., Badawi, M. A., EL-Moursy, S. A., and Attia, A. N. 1988. Response of soybean plants to foliar application of zinc and different levels of nitrogen. J. Agric. Sci. (Mansoura Univ., Egypt). 13: 556-563.
15. Li, M., Wang, S., Tian, X., Zhao, J., Li, H., Guo, C., Chen, Y., and Zhao, A. 2015. Zn distribution and bioavailability in whole grain and grain fractions of winter wheat as affected by applications of soil N and foliar Zn combined with N or P. Journal of Cereal Science 61: 26-32.
16. Malakooti, M. J., Malakooti, A., Majidi, A., Baybourdi, A., Salari, A., and Falahi, A. 2009. Comparative efficiency of enriched wheat flouring richens plant in the field of health promotion. J. of Food Sci. 6 (3): 118 Pp. (in Persian).
17. Maralian, H. 2012. Effect of supplementary nutrition with Fe, Zn chelates and urea on wheat quality and quantity. African Journal of Biotechnology 11 (11): 2661-2665.

18. Mozaffari, A., Saydat, S. A., Hashemi Dezfooli, S. A. 2006. Effect of Plant Density on Morphological and Physiological Characteristics of Four Cultivars of Durum Wheat (*Triticum turgidum var.durum*) under Dryland of Sarableh Region, Ilam. Research in Agricultural Science 2 (1): 47-56. (in Persian).
19. Pahlavan-Rad, M. R., and Pessarakli, M. 2009. Response of wheat plants to zinc, iron, and manganese applications and uptake and concentration of zinc, iron, and manganese in wheat grains. Communications in soil science and plant analysis 40 (7-8): 1322-1332.
20. Rangel, Z., and Graham, R. D. 1995. II. Importance of seed Zn content for growth on zinc-deficient soil. Plant Soil, 173: 267-274.
21. Seadh, S. E., El-Abady, M. I., El-Ghamry, A. M., and Farouk, S. 2009. Influence of micronutrients foliar application and nitrogen fertilization on wheat yield and quality of grain and seed. Journal of Biological Sciences 9 (8): 851-858.
22. Seilsepour, M. 2007. The study of Fe and Zn effects on quantitative and qualitative parameters of winter wheat and determination of critical levels of these elements in Varamin plain soils. Pajouhesh and Sazandegi In: Agronomy and Horticulture 20 (3): 123-133.
23. Siosemardeh, A., Ahmadi, A., Poustini, K., and Mohammadi, V. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research 98: 222-229.
24. Tatari, M., 2004. The effects of various levels of salinity and irrigation times on growth and yield of cumin in Mashhad conditions. MSc thesis. Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran. 87p. (in Persian with English abstract).
25. Torun, A., Gürtekin, I., Kalayci, M., Yilmaz, A., Eker, S., and Cakmak, I. 2001. Effects of zinc fertilization on grain yield and shoot concentrations of zinc, boron, and phosphorus of 25 wheat cultivars grown on a zinc-deficient and boron-toxic soil. Journal of Plant Nutrition 24: 1817-1829.
26. Varga, B., Svecnjak, I., and Pospisil, A. 2001. Winter wheat cultivar performance as affected by production systems in Croatia. Agronomy Journal 93: 961- 966.
27. Velu, G., Ortiz-Monasterio, I., Cakmak, I., Hao, Y., and Singh, R. P. 2014. Biofortification strategies to increase grain zinc and iron concentrations in wheat. Journal of Cereal Science 59: 365-372.
28. Yagdi, K. 2009. Path coefficient analysis of some yield components in durum wheat (*Triticum durum Desf.*). Pakistan Journal of Botany 41: 745-751.
29. Ziaeian, A. H., Malakouti, M. J. 2001. Effects of Fe, Mn, Zn and Cu fertilization on the yield and grain quality of wheat in the calcareous soils of Iran. In: Plant Nutrition: Springer, pp. 840-841.
30. Ziaeian, A. 2006. Effects of potassium and zinc application on silage corn cultivation. Journal of Soil and Water Sciences 20 (1): 36-37.



Effects of Foliar Application Time of Nano-micronutrients on Quantity and Qualitative Traits in Rainfed durum Wheat Genotypes in Moghan

Y. Firoozi¹ - H. Feizi^{2*} - A. Mehraban³ - M. Alipanah⁴

Received: 23-09-2016

Accepted: 17-10-2017

Introduction

Durum wheat (*Triticum turgidum* var.*durum*) because of the high protein content compared to other grain products plays a major role in providing the protein needed by humans. Different crop varieties have different performance potential even a figure from region to region does not have the same performance. Nano slow and controlled release fertilizers because of root elements in a good area, have high efficiency. In Iran, 300 to 400 tons of durum wheat annually produced which 60% is recoverable for production of pasta and other domestic needs is imported. Per capita consumption of pasta in the country is 5 kg per year (about one quarter of Europe) and with regard to nutrients such as gluten and beta-carotene in pasta and very low losses, it is necessary to increase the amount of its consumption. For this purpose, the government has taken incentive policies such as higher rates order of durum wheat (about 6%) compared to bread wheat and prizes export to exporters of this product, to increase its production and exports. This study aimed to evaluate the effect of foliar application time of Nano-chelate Super Plus on yield and its components and protein content in durum wheat varieties in Parsabad Moghan area was conducted.

Materials and Methods

The study was conducted as the form of randomly split-plot based on randomized complete block design with three replications. Treatments include the application of Nano-chelate fertilizer Super Plus (Biozar) with a concentration of two per thousand in four levels, (tilling, flowering, seed and control (no application)) as the main factor and cultivars of durum wheat lines operating in 18 level as were minor. Studied traits including plant height, number of tillers and fertile tillers, peduncle length, ear length, number of spikelets, number of seeds per plant, grain weight, straw weight, total seed weight per plant, total plant weight, number of days to heading, days to maturity, grain weight, protein content and seed yield. Each plot area of 2.7 square meters (6 lines with a length of 6 m and 20 cm spacing) and a total area of 6 square meters plot was harvested. The company proposed application of Biozar at the dose of 2 per thousand, according to the desired level, calculated and prepared and was sprayed every step of the treatments in question. At each plot also a sample of 1.5 kg of grain was sent to the laboratory to determine protein content of each sample. Finally, the obtained data collected using the SPSS and MSTAT-C statistical analysis soft wares for analysis of variance, and Interaction between treatments and figures and data clustering was performed and the results were presented.

Results and Discussion

Results showed that the highest grain yield obtained from spray at tilling stage in L16 (2948 kg ha^{-1}) compared to the control group ($771.70 \text{ kg ha}^{-1}$) by 228.01%. Comparison of the interaction of means showed that the highest grain yield in the spray at tilling stage L16 (2948 kg ha^{-1}) as compared to the control group ($771.70 \text{ kg ha}^{-1}$) 282.01% increase. Results of mean comparisons of the timing of application \times figures also showed the highest protein content in line L5 and the spray at tilling stage (12.23 %) as compared to control 23.54% increase. The lowest percentage of protein in the DEHDASHT and spraying at the seed (9.10%) respectively compared to control (9.53%) 4.73% decreased. So, it seems that the use of Nano-chelate Super plus ZFM (zinc, iron, manganese) which contains micro elements, amino acids as nitrogen source and as a powerful antioxidant ascorbic acid can be very effective to increasing yield and its components and also the protein content of durum wheat in dry land.

1- MSc Graduated student, Plant Production Department, University of Torbat Heydarieh, Iran

2- Assistant Professor, Plant Production Department, University of Torbat Heydarieh, Iran

3- Ardabil Agricultural and Natural Resources Research Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Ardebil, Iran

4- Associate Professor, Plant Production Department, University of Torbat Heydarieh, Iran

(*- Corresponding Author Email: h.feizi@torbath.ac.ir)

Conclusions

Nano-chelated Super Plus foliar application increased grain yield and yield components of durum wheat. According to the results the most appropriate timing of application of Super Plus for Durum Wheat was at the time of tillering and among the highest protein content and yield showed in the tillering stage to arrange in lines L5 (12.23 %) and L16 (2948 kg) respectively. Repeating this study for few years of research as well as in other areas could also be useful in confirming the results.

Keyword: Cereal, Line, Protein, Spray, Yield components